

Echocardiographie - Doppler

S. Lafitte, M. Lafitte, R. Roudaut

C.H.U. de Bordeaux ~ Hôpital Cardiologique du Haut Lévêque Pessac ~ France

Les Endocardites

Consensus sur les Indications de l'Echocardiographie-Doppler Transthoracique

Classe I

- Bilan d'une endocardite suspectée ou avérée.
- Surveillance, en cas de suspicion clinique même si l'échocardiographie-doppler transthoracique initiale est normale (la fréquence de répétition des examens sera déterminée au cas par cas).
- Bilan de complications survenues au cours de l'évolution (la fréquence de répétition des examens sera déterminée au cas par cas).

Classe II

- Surveillance, après guérison clinique et biologique de l'endocardite, des lésions et de leur retentissement hémodynamique (la fréquence de répétition des examens sera déterminée au cas par cas).

Consensus sur les Indications de l'Echocardiographie-Doppler Transoesophagienne

Classe I

- Suspicion clinique et / ou à l'échocardiographie-doppler transthoracique de complications (abcès, perte de substance, embolie...) survenues au cours de l'évolution (la fréquence de répétition des examens sera déterminée au cas par cas).
- Surveillance en cas de suspicion clinique même si l'échocardiographie-doppler transthoracique initiale est normale (la fréquence de répétition de l'examen sera déterminée au cas par cas).
- Contrôle lorsque l'échocardiographie-doppler transthoracique n'est pas contributive.
- Bilan en cas de forte suspicion clinique d'endocardite alors que les hémocultures restent négatives.
- Examen systématique en cas d'endocardite à germes particulièrement virulents (staphylocoques, entérocoques, levures, champignons...).
- Évaluation de la dysfonction récente d'une prothèse valvulaire.
- Évaluation, systématique en complément de l'échocardiographie-doppler transthoracique, lors d'une endocardite aortique avérée (abcès, perte de substance...).

Classe II

- Surveillance après guérison clinique et biologique de l'endocardite, des lésions et de leur retentissement hémodynamique (la fréquence de répétition de l'examen sera déterminée au cas par cas).
- Évaluation systématique en complément de l'échocardiographie-doppler transthoracique, en cas d'endocardite avérée sur une prothèse en position mitrale.
