

## Echocardiographie - Doppler

S. Lafitte, M. Lafitte, R. Roudaut

C.H.U. de Bordeaux ~ Hôpital Cardiologique du Haut Lévêque Pessac ~ France

### Myocardiopathies Restrictives

#### Consensus sur les Indications de l'Échocardiographie-Doppler Transthoracique

Arch Mal Coeur 1999 ;92 :1275-6.

##### Classe I

- Insuffisance cardiaque sans cardiomégalie sur la radiographie thoracique.
- Patient atteint d'une pathologie systémique connue pour donner des dysfonctions myocardiques avec un profil hémodynamique restrictif (sclérodermie, syndrome de Sharp, amylose, maladie de Fabry, syndrome hyperéosinophilique...).
- Suspicion clinique de cardiomyopathie restrictive.
- Modification de la symptomatologie clinique chez un patient ayant une cardiomyopathie restrictive documentée.

##### Classe II

- Echocardiographie doppler pour guider la thérapeutique, en particulier la déplétion.
- Evaluation annuelle systématique si patient cliniquement stable dans les formes typiques avec syndrome hémodynamique restrictif.
- Persistance de signes d'insuffisance cardiaque de cause indéterminée après un premier examen non contributif.

##### Classe III

- Echocardiographie bidimensionnelle isolée sans étude doppler.
- Echocardiographie transoesophagienne en l'absence de suspicion d'endocardite, de fibrillation auriculaire ou d'embolie systémique.

-----