

Échocardiographie - Doppler

S. Lafitte, M. Lafitte, P. Réant, R. Roudaut

C.H.U. de Bordeaux ~ Hôpital Cardiologique du Haut Lévêque Pessac ~ France

Syndrome d'Aorte Dououreuse : Synthèse

- Diagnostic différentiel de DA – Rôle essentiel de ETO

- . les lésions sont plus fréquentes sur l'aorte thoracique descendante

- Hématome de paroi aortique (10% des DA)

- Diagnostic positif :

- . épaissement en croissant (aspect granité)
- . sans porte d'entrée

- Diagnostic topographique :

- . le plus souvent type B

- Diagnostic différentiel :

- . anévrisme de l'aorte avec thrombus mural
- . DA avec faux chenal thrombosé
- . plaque athéroscléreuse plane
- . graisse péri aortique
- . tumeur aortique
- . aortite

- Ulcère athéromateux pénétrant : rare, touche surtout sujet très âgé, athéroscléreux

- Diagnostic positif :

- difficile, nécessite examen très attentif
- ulcération localisée de la paroi aortique allant de la plaque ulcérée profonde au faux anévrisme : parfois associée à un hématome de la paroi environnante, généralement dans un contexte d'aorte très athéromateuse.

- Diagnostic différentiel :

- . DA localisée
- . hématome de paroi
- . faux anévrisme

-----o0o-----